

# Tiques à pattes noires

Solutions Bayer



## // LE PROBLÈME

Les tiques à pattes noires sont de plus en plus abondantes dans plusieurs régions du Canada. Ces arthropodes sont vus comme une menace importante pour la santé publique à cause de leur capacité à transmettre plusieurs maladies à l'humain, dont la maladie de Lyme et l'anaplasmose.

## // CYCLE DE VIE ET COMPORTEMENT

Les tiques à pattes noires ont un cycle de vie de deux ans. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 18 000 œufs chaque printemps. L'été, les œufs éclosent en des larves à six pattes qui se nourrissent du sang des petits animaux comme les oiseaux et les souris, ce qui permet aux tiques de propager les maladies. Au printemps suivant, les larves sont devenues des nymphes à 8 pattes qui se nourrissent d'animaux plus gros comme les chevreuils et les humains. À l'automne, les nymphes sont matures et terminent leur cycle de vie.

Parce que les tiques à pattes noires ne peuvent pas voler ou sauter, elles doivent ramper jusqu'à la végétation ou sur les structures pour adhérer à un hôte de passage. Une fois attachée, la tique reste sur l'hôte et se nourrit pendant plusieurs jours. Les données actuelles suggèrent que les risques plus élevés d'infection pour les humains surviennent dès la fin du printemps et se prolongent pendant tout l'été.

## // TERRITOIRE RÉGIONAL ET HABITATS LOCAUX

Géographiquement, les populations de tiques se développent vers le nord, ce, à une allure de 45 km par année possiblement dû au réchauffement au courant des dernières décennies et aux changements dans les comportements migratoires de la faune. Un exemple de ce développement est la tique étoilée d'Amérique, indigène du sud des États-Unis, mais maintenant présente en Ontario. Les populations de tiques à pattes noires augmentent rapidement et chaque printemps atteignent leur maximum au milieu de l'été alors que les populations de tiques noires (*Ixodes scapularis*) peuvent rester élevées pendant les mois d'automne.

Les habitats habituels des tiques sur les terrains de golf sont:

- Les zones d'herbes longues, comme les zones indigènes et sur le pourtour des fosses de sable
- Les zones dans ou près des périmètres des lignes d'arbres
- Sur les plantations ornementales ou les zones de buissons denses, surtout celles à l'ombre

\*Santé Publique Ontario a déclaré que les tiques à pattes noires peuvent être transportées par les oiseaux migrateurs et les petits mammifères; il est donc possible de rencontrer une tique à pattes noires infectée presque partout.

## // SOLUTIONS DE CONTRÔLE DE BAYER

DeltaGardMD SC, contenant la matière active deltaméthrine, est maintenant homologué pour supprimer les tiques à pattes noires. C'est un insecticide à base de pyréthrine, à large spectre et à action rapide, homologué pour supprimer les tiques, les fourmis, les punaises des céréales, les vers-gris et les chenilles tisseuses dans les gazons.

Pour supprimer la tique à pattes noires, traiter avec DeltaGard SC à raison de 12 mL par 100 m<sup>2</sup> dans un volume d'eau de 8 L par 100 m<sup>2</sup>. Appliquer sur les zones du terrain de golf qui sont plus sensibles aux populations de tiques, comme l'herbe longue indigène et les fosses, les périmètres des lignes d'arbres, les zones de buisson denses et les endroits ombragés.

## AUTRES RESSOURCES UTILES :

- Gouvernement du Canada
- Santé Publique Ontario
- Association du golf des États-Unis

Pour plus d'informations sur les stratégies pour maîtriser les maladies et les insectes, communiquez avec votre Gérant de territoire de ventes.



Sur un parcours de golf, des balles perdues nous mènent parfois hors des sentiers battus et dans des zones d'herbe à l'état naturel. Lorsque vous retournez sur l'aire de jeu, ne ramenez pas de parasites opportunistes!

## // POURQUOI LES TIQUES SONT-ELLES UNE PRÉOCCUPATION?

Certaines tiques, dont la tique à pattes noires, peuvent transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme, ce qui en fait une préoccupation majeure en matière de santé publique. La maladie de Lyme gagne du terrain au Canada à mesure que ces tiques se propagent dans de nouvelles régions.

## // COMMENT ÉVITER LES PIQÛRES DE TIQUE



### COUVREZ-VOUS! PORTEZ...

- // des vêtements de couleur claire pour identifier plus facilement la présence de tiques
- // des chaussures fermées
- // un pantalon long rentré dans vos chaussettes
- // un haut à manches longues



### UTILISEZ UN INSECTIFUGE

Appliquez un insectifuge, ou insecticide, contenant du DEET ou de l'icaridine sur vos vêtements et votre peau exposée. Lisez toujours l'étiquette pour connaître le mode d'emploi du produit.



### METTEZ VOS VÊTEMENTS DANS LA SÉCHEUSE

Tuez les tiques qui pourraient se trouver sur vos vêtements en les mettant dans la sècheuse à température élevée pendant au moins 10 minutes avant de les laver



### EXAMINEZ-VOUS

Après une sortie à l'extérieur, vérifiez la présence de tiques sur votre corps. Examinez bien l'arrière de vos genoux, votre tête, votre nombril, vos aines, vos aisselles, votre dos (utilisez un miroir pour y arriver ou demandez à quelqu'un de le faire pour vous).

C'est une bonne idée de prendre une douche dès que possible pour vous débarrasser de toute tique.

Source : <https://www.ontario.ca/page/lyme-disease#section-2>

## // COMMENT RETIREZ UNE TIQUE

Retirer les tiques dans les 24 à 36 heures suivant une piqûre de tique permet habituellement de prévenir l'infection. Vous pouvez retirer une tique qui s'est accrochée à vous en suivant ces étapes :

- 1 À l'aide d'une pince à épiler propre, saisissez la tête aussi près que possible de la peau et tirez lentement en ligne droite, perpendiculairement à la peau. Évitez de tourner et d'écraser la tique.
- 2 Si les pièces buccales restent logées dans la peau, retirez-les avec la pince ou, si vous n'y arrivez pas, n'y touchez plus et laissez la peau cicatriser. Consultez un professionnel de la santé.
- 3 Nettoyez la zone piquée et vos mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool pour les mains.
- 4 Essayez de conserver la tique qui vous a piqué dans un contenant scellé et notez la date de la piqûre. Apportez la tique à votre rendez-vous médical pour aider votre médecin à évaluer votre état de santé.

