



Cerfeuil sauvage

Solutions Bayer

// LE PROBLÈME

Le cerfeuil sauvage (*Anthriscus sylvestris*) est une mauvaise herbe nuisible qui, a envahi le bord des routes et autres terrains non cultivés, pâturages, lisières de boisés et boisés clairsemés au sol riche de certaines régions. Il ressemble à d'autres membres de la famille des carottes et n'est donc parfois décelé que lorsqu'il est devenu problématique. Il atteint 30 cm à 1,5 m de hauteur ressemble à la carotte sauvage. Contrairement à la carotte sauvage, cependant, il pousse habituellement en bouquets denses et étendus. Lorsque les bouquets de cerfeuil sauvage sont bien établis, les plants se propagent vigoureusement et peuvent être très difficiles à éliminer. Il étouffe la végétation désirée et les communautés de plantes indigènes, ce qui affecte l'habitat faunique.

Le cerfeuil sauvage est une plante bisannuelle ou une vivace de courte longévité qui se propage par des graines et des bourgeons à la base. Les graines se propagent facilement par les oiseaux, les humains, l'équipement mécanique, les véhicules récréatifs et l'eau. La première année, des feuilles basales semblables à des fougères poussent. Les plants produisent une racine pivotante qui s'étend jusqu'à 1,8 m de profondeur. La deuxième année ou plus tard, les fleurs apparaissent sous forme de panicules ou d'ombelles, comptant cinq petits pétales blancs.

// LES SIGNES À SURVEILLER

Voici les principales caractéristiques permettant de distinguer le cerfeuil sauvage des autres espèces :

- Le cerfeuil sauvage fleurit beaucoup plus tôt que les autres plantes semblables, à la fin de mai, et sa floraison se termine au début de juin. La carotte sauvage ne commence à fleurir qu'en juin, et sa floraison se poursuit jusqu'en septembre.
- Le cerfeuil sauvage a des feuilles composées semblables à des fougères dont la base se referme sur la tige. La tige du cerfeuil sauvage est creuse et distinctement nervurée. La carotte sauvage a des folioles plus finement divisées qui sentent la carotte lorsqu'elles sont écrasées.
- Les graines de cerfeuil sauvage sont lisses et passent du vert au brun foncé. Les graines de carotte sauvage ont quant à elles des rangées d'épines crochues et restent souvent en grappes en forme de nid d'oiseau sur les plants.

Le cerfeuil sauvage est porteur d'un virus qui infecte les carottes, le panais et le céleri.

// SOLUTIONS BAYER

Appliquez les herbicides tôt, peu de temps avant la floraison ou un mois après la fauche au stade des boutons avancés.

Appliquez Navius® FLEX ou Truvist® sur les petites plantes de cerfeuil, de préférence lorsqu'elles ont 10 à 15 cm de hauteur, pour mieux les maîtriser. Si les plantes de cerfeuil ont plus de 15 cm de hauteur, ou en cas d'infestations importantes, la bouillie de pulvérisation doit recouvrir tout le feuillage pour maîtriser efficacement la plante. Pour appliquer le produit, utilisez un équipement qui offre la meilleure couverture des plantes tout en minimisant la dérive de pulvérisation. N'oubliez pas que les plantes plus grandes, les traverses de chemin de fer, les glissières de sécurité et autres obstacles peuvent cacher les plantes plus petites, leur faire de l'ombre et enfreindre le contact avec les plus petites plantes visées par le traitement.

La maîtrise des rosettes de cerfeuil sauvage à la fin de l'été ou à l'automne est efficace si les plants sont encore verts; elle préviendra la production de graines l'année suivante. À la fin de l'été et à l'automne, le photosynthétat circule dans les racines, ce qui favorise la maîtrise des racines par de nombreux herbicides à application foliaire. L'utilisation d'herbicides en association avec une méthode de maîtrise résiduelle a l'avantage d'empêcher la germination des plantules après le traitement.



Cerfeuil sauvage

Solutions Bayer

Nettoyer l'équipement après avoir appliqué un herbicide, tondu la pelouse, creusé des fossés ou fait tout autre travail dans des zones infestées aidera à prévenir la propagation linéaire le long des emprises. Pour en savoir plus sur les protocoles de nettoyage des entrepreneurs : https://www.ontarioinvasiveplants.ca/wp-content/uploads/2016/07/Clean-Equipment-Protocol_June2016_D3_WEB-1.pdf

Une fois l'infestation maîtrisée, il est important d'établir une végétation concurrente désirable pour prévenir les nouvelles infestations.

Type d'application	Solution	Dose	Moment de l'application
Désherbage sélectif en postlevée	Navius FLEX ou Truvist	167 g/ha 168 g/ha	Printemps (émergence) (mi-mai) – de préférence avant que le cerfeuil sauvage atteigne 15 cm de hauteur. Automne (septembre) – veiller à ce qu'il y ait un volume d'eau adéquat pour maîtriser les rosettes d'automne.

Pour plus d'informations sur la gestion efficace de la végétation, communiquez avec le représentant de Bayer ou visitez le es.bayer.ca.



Cerfeuil en fleur



Cerfeuil tapissant le sol



Science for a **better life**

es.bayer.ca

1-888-283-6847

LISEZ ET SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS SUR L'ÉTIQUETTE.

Bayer, la croix Bayer, Navius FLEX et Truvist sont des marques de commerce de Bayer. 10/19-66653